

Mon enfant a été vacciné par le **BCG**



Pôle Oncochirurgie pulmonaire cardiométabolique

Sites de Meaux et Coulommiers

Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT)

IDE du CLAT : **01 78 71 42 58**

Pôle Femme et enfant

Site de Marne-la-Vallée

Service de Pédiatrie

Secrétariat consultations : **01 61 10 65 82**

La vaccination par le BCG permet d'éviter les formes graves de la tuberculose chez l'enfant (méningite et septicémie).

Elle n'est plus obligatoire, mais reste très fortement recommandée dans certaines circonstances ; en particulier, dans les régions où le risque de tuberculose est encore important.

LES 7 RÈGLES D'OR

Après une vaccination par le BCG, il est tout à fait normal que la zone autour de l'endroit où a été faite la piqûre soit un peu dure au toucher.

Parfois, une ulcération et un petit écoulement de liquide surviennent au bout de quelques semaines. Un ganglion peut aussi apparaître sous le bras vacciné.

En général, toutes ces réactions disparaissent, au plus tard en quelques mois, en ne laissant qu'une discrète cicatrice.

Voici, cependant, quelques règles simples que vous devez respecter lorsque votre enfant vient d'être vacciné par le BCG.

RÈGLE

1

Laissez **le bras vacciné à découvert le plus souvent possible**, pour faciliter la cicatrisation.

RÈGLE

2

Mettez **des vêtements qui ne serrent pas** l'endroit où a été faite la piqûre.

RÈGLE

3

S'il s'écoule un peu de liquide à l'endroit où a été faite la piqûre, appliquez simplement **une compresse sèche et stérile**.

RÈGLE

4

N'APPLIQUEZ AUCUNE POMMADE, NI TALC, NI AUCUN AUTRE PRODUIT, à l'endroit où a été faite la piqûre ou sur le ganglion.

RÈGLE

5

Ne donnez **aucun antibiotique**.

RÈGLE

6

Le bain et la douche sont autorisés dès le jour de la vaccination. En revanche, évitez les baignades en piscine ou à la mer s'il s'écoule un peu de liquide à l'endroit où a été faite la piqûre.

RÈGLE

7

Consultez votre médecin si :

- la zone dure au toucher (*apparue autour de l'endroit où a été faite la piqûre*) mesure plus de 3 cm ;
- votre enfant est gêné dans ses mouvements ;
- le ganglion, qui est apparu sous le bras, est visible à l'œil nu et ramolli (*suppuration*).